


Który APAP wybrać na ból?



500 mg paracetamol

WSKAZANIA




WAŻNE INFORMACJE

- Nie uzależnia. Nie zaburza koncentracji. Nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.
- Można stosować również u osób:**
Z chorobami układu krążenia (choroba wieńcowa, nadciśnienie, po zawale, udarze niedokrwiennym, osoby z zaburzeniami rytmu serca, przyjmujący kardioprotekcyjne dawki kwasu acetylosalicylowego).
- Z chorobami przewodu pokarmowego (np. wrzody żołądka, refluks, choroby zapalne jelit) oraz na czczo.
- Kobiety w ciąży i karmiące piersią. Stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez możliwie jak najkrótszy czas. Przed zastosowaniem skonsultować się z lekarzem.



500 mg paracetamol, 65 mg kofeina

WSKAZANIA




WAŻNE INFORMACJE

- Nie uzależnia. Nie zaburza koncentracji. Nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.
- Nie stosować u osób z zaburzeniami rytmu serca.
- Można stosować również u osób:**
Z chorobami układu krążenia (choroba wieńcowa, nadciśnienie, po zawale, udarze niedokrwiennym, przyjmujący kardioprotekcyjne dawki kwasu acetylosalicylowego).
- Z chorobami przewodu pokarmowego (np. wrzody żołądka, refluks, choroby zapalne jelit) oraz na czczo.



500 mg paracetamol, 200 mg ibuprofen

WSKAZANIA




WAŻNE INFORMACJE

- Dla osób wymagających zastosowania silniejszego leku przeciwbólowego (gdy monoterapia paracetamolem i ibuprofenem nie przynosi oczekiwanego efektu).
- Paracetamol i ibuprofen w jednej tabletkce.
- działa nawet 8h.
- Nie uzależnia.
- Nie wykazano działań niepożądanych innych niż obserwowane w przypadku ibuprofenu lub paracetamolu stosowanych oddzielnie.



500 mg paracetamol, 25 mg difenhydramina

WSKAZANIA



WAŻNE INFORMACJE

- Nie uzależnia.
- W czasie stosowania leku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych.
- Można stosować również u osób:**
Z chorobami przewodu pokarmowego (np. wrzody żołądka, refluks, choroby zapalne jelit) oraz na czczo.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

* Na ból wymagający silniejszego działania przeciwbólowego niż ibuprofen lub paracetamol stosowane oddzielnie (pkt. 4.1 CHPL Apap Intense)

APAP. *Paracetamolum* 500 mg; tabletki powlekane. **Wskazania do stosowania.** Bóle o różnej etiologii: głowy (w tym napięciowe bóle głowy), menstruacyjne, zębów, mięśni, kostno-stawowe, gardła, nerwobóle oraz gorączka, np. w przeziębieniu i grypie. APAP jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat. **Przeciwwskazania.** Nadwrażliwość na paracetamol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka niewydolność wątroby lub nerek. Wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej. Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat. **Podmiot odpowiedzialny:** US Pharmacia Sp. z o.o.

APAP Extra. *Paracetamolum* 500 mg, *Coffeinum* 65 mg; tabletki powlekane. **Wskazania do stosowania:** Bóle o różnej etiologii. **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą, wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej, choroba alkoholowa, ciężka niewydolność wątroby lub nerek, zaburzenia rytmu serca, stosowanie inhibitorów MAO oraz okres do 2 tygodni po ich odstawieniu, I trymestr ciąży i karmienie piersią. Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat. **Podmiot odpowiedzialny:** US Pharmacia Sp. z o.o.

APAP intense, ibuprofen 200 mg i paracetamol 500 mg, tabletki powlekane. **Wskazania do stosowania:** produkt leczniczy stosowany jest w doraźnym leczeniu łagodnego lub umiarkowanego bólu związanego z migreną, bólu głowy, bólu pleców, bólów menstruacyjnych, bólu zęba, bólów reumatycznych i mięśniowych, bólu związanego z łagodnymi postaciami zapalenia stawów, przeziębieniem oraz grypą, bólu gardła lub gorączki. Produkt leczniczy jest szczególnie odpowiedni do leczenia bólu wymagającego silniejszego działania przeciwbólowego niż ibuprofen lub paracetamol stosowane oddzielnie. Produkt leczniczy APAP intense przeznaczony jest dla dorosłych w wieku od 18 lat. **Przeciwwskazania:** u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; u pacjentów z reakcjami nadwrażliwości w wywiadzie (np. skurcz oskrzeli, obrzęk naczynioruchowy, astma, zapalenie błony śluzowej nosa lub pokrzywka) związanymi z przyjęciem kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ); u pacjentów z czynną lub występującą w wywiadzie nawracającą chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy, i (lub) krwotokiem z żołądka lub dwunastnicy (co najmniej dwa osobne przypadki stwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia); u pacjentów z owrzodzeniem, perforacją lub krwawieniem z przewodu pokarmowego, czynnym lub w wywiadzie, łącznie z przypadkami związanymi z przyjęciem leków z grupy NLPZ; u pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia; u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością nerek lub ciężką niewydolnością serca (klasa IV wg NYHA); w przypadku równoczesnego stosowania z innymi lekami z grupy NLPZ, w tym z selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy-2 (COX-2) oraz kwasem acetylosalicylowym w dawkach większych niż 75 mg na dobę – zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych; w przypadku jednoczesnego stosowania innych produktów leczniczych zawierających paracetamol – zwiększone ryzyko wystąpienia ciężkich działań niepożądanych; w ostatnim trymestrze ciąży w związku z ryzykiem przedwczesnego zamknięcia przewodu tętniczego płodu i wystąpienia nadciśnienia płucnego. **Podmiot odpowiedzialny:** US Pharmacia Sp. z o.o., ul. Ziębicka 40, 50-507 Wrocław

APAP Noc. *Paracetamolum* 500 mg, *Diphenhydramini hydrochloridum* 25 mg; tabletki powlekane. **Wskazania do stosowania:** Krótkotrwałe leczenie bólu w tym: bólu głowy, bóle kostno-stawowe, bóle mięśni, bóle zębów, bóle menstruacyjne, nerwobóle, bóle związane z przeziębieniem i grypą, powodującego trudności w zasypianiu. **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Ciężka niewydolność wątroby lub nerek. Wirusowe zapalenie wątroby. Stosowanie inhibitorów MAO oraz okres do 2 tygodni po ich odstawieniu. Jaskra. Rozrost gruczołu krokowego, Porfiria. Astma oskrzelowa w fazie zaostrzenia. Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat. **Podmiot odpowiedzialny:** US Pharmacia Sp. z o.o.